


# ANTIPARAZITIKA KRKA



	LÉČBA A PREVENCE VNĚJŠÍCH PARAZITŮ				LÉČBA A PREVENCE VNITŘNÍCH PARAZITŮ	
	Ataxxa®	FYPRYST®	FYPRYST® COMBO	FYPRYST® SPREJ	Dehinel®	Dehinel® Plus
druh zvířete	pes*	kočka, pes	kočka, pes, fretka	kočka, pes	kočka	pes
dávkování	200 mg/40 mg psi do 4 kg 500 mg/100 mg psi od 4kg do 10 kg 1250 mg/250 mg psi od 10 kg do 25 kg 2000 mg/400 mg psi nad 25 kg	Kočka(50 mg) – od 1 kg S (67 mg) – psi od 2 do 10 kg M (134 mg) – psi od 10 do 20 kg L (268 mg) – psi od 20 do 40 kg XL (402 mg) – psi nad 40 kg	Kočka, fretka (50/60 mg) – od 1 kg S (67/60.3 mg) – psi od 2 do 10 kg M (134/120.6 mg) – psi od 10 do 20 kg L (268/241.2 mg) – psi od 20 do 40 kg XL (402/361.8 mg) – psi nad 40 kg	100 ml	Kočka 1tbl na 4 kg živé hmotnosti	Dehinel Plus Flavour 1 tbl na 10 kg živé hmotnosti Dehinel Plus XL 1 tbl na 35 kg živé hmotnosti
věkový limit	> 7 týdnů	kočka > 8 týdnů pes > 8 týdnů	kočka, pes > 8 týdnů fretka > 6 měsíců	koťata i štěňata od 2 dnů věku	podání dle váhového limitu	pes > 2 týdny
váhový limit	> 1,5 kg	kočka > 1 kg pes > 2 kg	kočka > 1 kg pes > 2 kg fretka: věkový limit	podání dle věkového limitu	kočka > 1 kg	pes > 2 kg
březost	přínos x riziko	ANO	ANO	ANO	NE	NE v průběhu 1. a 2. trimestru
laktace	přínos x riziko	ANO	kočka s opatrností, pes ANO	ANO	ANO	ANO
dospělci blech	+	+	+	+		
vývojová stadia blech	larvy		vajíčka, larvy			
klíšťata	+	+	+	+		
všenky		+	+	+		
mušky	+					
komáři	+					
repelentní účinek	+					
hlístice					+	+
tasemnice					+	+

\* NEPOUŽÍVAT U KOČEK = smrtelně nebezpečné

**Ataxxa** 200 mg/40 mg – pro psy do 4 kg, jedna pipeta 0,4 ml obsahuje: Permethrinum 200,0 mg, Imidaclopridum 40,0 mg. Ataxxa 500 mg/100 mg - pro psy od 4 kg do 10 kg, jedna pipeta 1,0 ml obsahuje: Permethrinum 500,0 mg, Imidaclopridum 100,0 mg Ataxxa 1250 g/250 mg – pro psy od 10 kg do 25 kg, jedna pipeta 2,5 ml obsahuje: Permethrinum 1250,0 mg, Imidaclopridum 250,0 mg. Ataxxa 2000 mg/400 mg – pro psy nad 25 kg, jedna pipeta 4,0 ml obsahuje: Permethrinum 2000,0 mg, Imidaclopridum 400,0 mg. Indikace: Psi: Léčba a prevence infestace blechami (*Ctenocephalides felis*). Blechy na psech jsou zabíjeny během jednoho dne po aplikaci. Jednorázová aplikace chrání před dalším napadením blechami po dobu 4 týdnů. Přípravek může být použit jako součást léčebné strategie alergie na bleší kousnutí (FAD). Přípravek má persistentní, akaricidní účinnost proti infestaci klíšatými (*Rhipicephalus sanguineus* a *Ixodes ricinus* po dobu 4 týdnů), a Dermacentor reticulatus po dobu 3 týdnů). Klíšata přítomná na psovi už v době aplikace nemusí být usmrcena během 2 dnů po léčbě a mohou zůstávat přichycená a viditelná. Jednorázová aplikace má repelentní (zabraňující sání) účinnost proti flebotomům (*Phlebotomus perniciosus*) po dobu 3 týdnů a proti komárům *Aedes aegypti* po dobu 7 až 14 dnů po aplikaci. Kontraindikace: Ataxxa : pro absenci dostupných informací nemá být přípravek používán u štěňat do 7 týdnů věku nebo u psů do váhy 1,5 kg ž. hm. Nepoužívat v případě přecitlivělosti na účinné látky nebo na některou z pomocných látek. Nepoužívat u koček - smrtelné nebezpečí. Není určeno pro potravinová zvířata. Dávkování: Pouze k vnějšímu použití, podání nakapáním na neporušenou kůži – spot-on. Doporučená minimální dávka je: 10 mg/kg živé hmotnosti (ž.hm.) imidaclopridu a 50 mg/kg živé hmotnosti (ž.hm.) permethrinu. Pro psy > 40 kg je možno použít vhodnou kombinaci pipet. V závislosti na míře zamoření blechami může být nutno ošetření opakovat. Interval mezi dvěma ošetřeními by měl být 4 týdny. Nepoužívejte opakované podání častěji jak jednou týdně. Zvláštní upozornění: Může dojít ke kontaktu s jednotlivými klíšatými nebo ke kousnutí jednotlivými flebotomy nebo komáry *Aedes aegypti*. Z tohoto důvodu nemůže být zcela vyloučen přenos infekčních onemocnění těmito parazity za nepříznivých podmínek. Jelikož přípravek má repelentní (zabraňující sání) účinek proti komárům *Aedes aegypti* 7 dní po podání, měl by být přípravek aplikován nejdříve 1 týden před očekávaným vystavením zvířete komárům. Přípravek zůstává účinný proti blechám i při namočení zvířete. Nepoužívejte u koček. Tento přípravek je extrémně jedovatý pro kočky a může být pro ně smrtelný z důvodu specifické fyziologie koček, které nejsou schopné metabolizovat určité látky včetně permethrinu. Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům: Zamezte kontaktu přípravku s kůží, očima a ústy. Po použití přípravku si důkladně umyjte ruce. V případě náhodného potřísnění kůže umyjte ihned zasažené místo mýdlem a vodou. Pokud podráždění kůže nebo očí přetrvává, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu ošetřujícím lékařům. Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud aplikovaný přípravek nezaschne. Doporučuje se ošetřovat zvířata navečer, a nedovolit čerstvě ošetřeným zvířatům spát s jejich majiteli, zvláště pak s dětmi. Interakce: Nejsou známy. Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky: Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a laktace. Použití pouze pro zvláště terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem. Nežádoucí účinky: Ve velmi vzácných případech se může vyskytnout svědění, ztráta srsti, zčervenání, otok a eroze v místě aplikace, které obvykle samy vymizí. Ve velmi vzácných případech mohou být u psů pozorovány změny chování (neklid, třes, kručení nebo válení), gastrointestinální příznaky (zvracení, průjem, nadměrné slinění, snížená chuť k jídlu) a neurologické příznaky jako vratký pohyb a záškuby nebo letargie u psů citlivých na složku permethrin. Tyto příznaky jsou většinou přechodné a samy vymizí. Doba použitelnosti: 3 roky. Uchovávání: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Platí pro balení 1 pipeta: Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu. Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

**Dehinel** 230 mg/20 mg potahované tablety pro kočky **Složení:** Jedna potahovaná tableta obsahuje Pyrantel embonas 230 mg (odpovídá pyrantelumu 80 mg) Praziquantelumu 20 mg. **Cílové druhy zvířat:** kočky **Indikace:** Léčba smíšených invazí způsobených hlísticemi a tasemnicemi u koček, a to dospělými stádii škrkavce: *Toxocara cati* (syn. *mystax*), dospělými stádii měchovců: *Ancylostoma tubaeforme*, *Ancylostoma braziliense*, tasemnicemi: *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Hydatigera* (*Taenia*) *taeniaeformis*, *Mesosecocestoides* spp., *Joyeuxiella pasqualei*. **Dávkování:** Perorální podání. 5 mg praziquantelu a 20 mg pyrantelumu báze (to odpovídá 57,5 mg pyrantel-embonátu) na 1 kg živé hmotnosti. To odpovídá 1 tabletě na 4 kg živé hmotnosti. Nepoužívat u koťat s živou hmotností menší než 1 kg, jelikož není možné zajistit správné dávkování. Tablety se podávají přímo do tlamy, ale v případě potřeby je možné je podávat i v malém množství krmiva. Jednorázová léčba. **Kontraindikace:** Nepoužívat v případě známé přecitlivělosti na léčivé látky nebo na některou z pomocných látek. Není určeno pro potravinová zvířata. **Zvláštní upozornění:** Invaze tasemnicemi se vyskytuje u koček nejdříve ve třetím týdnu života. Blechy jsou meziphostiteli jednoho běžně rozšířeného druhu tasemnic - *Dipylidium caninum*. Invaze tasemnicemi se bude nepochybně opakovat, pokud nedojde k regulaci meziphostitelů, jako jsou blechy, myši atd. Z důvodu zvýšení rizika možného vývoje rezistence, které by mohlo vést k neúčinné terapii, je třeba postupovat k podání přípravku oběžně a vyhnout se následujícím praktikám: příliš častému a opakujícímu se používání anthelmintik ze stejné skupiny, příliš dlouhé době podávání; poddávkování, z důvodu špatného stanovení živé hmotnosti nebo chybného podání přípravku. **Interakce:** Nepoužívejte současně se sloučeninami piperazinu, protože specifické působení piperazinu (nervosvalová paralýza parazitů) může inhibovat účinnost pyrantelu (spastickou paralýzu parazitů). **Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky:** Nepoužívat během laktace. Lze použít během laktace. **Nežádoucí účinky:** Ve velmi vzácných případech mohou nastat mírné a přechodné poruchy zažívacího traktu, jako je hypersalivace a/nebo zvracení, a mírné a přechodné neurologické poruchy, jako je ataxie. **Balení:** Krabička s 1 blisterem po 2 tabletách nebo krabička se 3 blistry po 10 tabletách. **Doba použitelnosti:** 3 roky. **Uchovávání:** Zbylé nepoužité poloviny tablet uchovávejte při teplotě do 25 °C. Zbylé nepoužité poloviny tablet vraťte zpět do blistry a uchovávejte v původním obalu mimo dohled a dosah dětí. Veterinární léčivé přípravky, které jsou volně k dostání bez lékařského předpisu – platí pro balení 1 blister po 2 tabletách.

**Dehinel Plus Flavour**, tablety pro psy: 1 tableta obsahuje: Praziquantelumu 50 mg, Pyrantel embonas 144 mg, Febantelumu 150 mg., **Dehinel Plus XL**, tablety pro psy: 1 tableta obsahuje: Praziquantelumu 175 mg, Pyrantel embonas 504 mg, Febantelumu 525 mg. **Cílové druhy zvířat:** Dehinel Plus Flavour: Psi (malá a střední velikost). Dehinel Plus XL: Psi (velká a zvláště velká velikost). **Indikace:** Léčba smíšených infekcí vyvolaných obylými a plochými červy u dospělých psů a štěňat: škrkavky: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina* (dospělci a stádia těsně před dosažením dospělosti); měchovci: *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum* (dospělci); tasemnice: *Taenia* spp., *Dipylidium caninum*. **Dávkování:** Perorální podání. Doporučená dávka je 15 mg febantelumu, 14,4 mg pyrantelu a 5 mg praziquantelu na 1 kg živé hmotnosti, tj. 1 tableta Dehinel Plus Flavour na 10 kg živé hmotnosti nebo resp. 1 tableta Dehinel Plus XL na 35 kg živé hmotnosti. Tablety se mohou k dosažení přesné dávky púlit/čtvrtit (tablety Dehinel Plus XL jen púlit). Tablety se mohou psovi podávat přímo nebo zamaskované v potravě. Omezení příjmu potravy nejsou nutná ani před podáním ani po podání přípravku. K potlačení škrkavek musí být fena přeléčena 2 týdny po vrhu štěňat a každé 2 týdny až do odstavení štěňat. K rutinní kontrole se doporučuje jednotlivá dávka ve 3 měsíčních intervalech. V případě silné infekce obylými červy by se měla podat opakovaná dávka po 14 dnech. Štěňata mohou být přípravkem Dehinel Plus Flavour odčervena od věku 2 týdnů a každé 2 týdny do věku 12 týdnů. Poté by měla být léčena ve 3 měsíčních intervalech. Je vhodné léčit fenu ve stejnou dobu jako štěňata. **Kontraindikace:** Nepodávejte současně s přípravky s obsahujícími piperazin. Nepřekračujte doporučenou dávku při léčbě březích fen. Nepodávejte zvířatům se známou hypersenzitivitou na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku těchto přípravků. Dehinel Plus Flavour: Nepoužívat u psů mladších než 2 týdny a/nebo o hmotnosti menší než 2 kg. **Zvláštní upozornění:** Blechy jsou meziphostitelem pro běžný druh tasemnic rodu *Dipylidium caninum*. Infekce tasemnicemi se bude opakovat, pokud nebudou meziphostitelé, jako jsou blechy, myši atd. pod kontrolou. Dehinel Plus XL: Tento přípravek není určen pro použití u psů s živou hmotností menší než 17,5 kg. Interakce: Nepodávejte současně s piperazinem. Současné použití s jinými cholinergními látkami může vést k toxicitě. **Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky:** Poradte se veterinárním lékařem, pokud chcete použít přípravky k odčervení oblych červů u gravidních fen. Nepodávejte fenám během prvních dvou třetin březosti. Přípravky se mohou podávat v průběhu laktace. **Nežádoucí účinky:** Ve vzácných případech se může u štěňat přechodně vyskytnout řídká stolice, průjem a/nebo zvracení. **Balení:** Dehinel Plus Flavour: 2 tablety, 100 tablet. Dehinel Plus XL: 2 tablety, 12 tablet. **Doba použitelnosti:** 3 roky. **Uchovávání:** Žádné zvláštní podmínky pro uchovávání. Veterinární léčivé přípravky, které jsou volně k dostání bez lékařského předpisu – platí pro balení 1 blister po 2 tabletách.

**Fypryst** 50 mg pro kočky: 1 pipeta (0,5 ml) obsahuje: 50 mg Fipronilumu. Fypryst 67 mg pro psy: 1 pipeta (0,67 ml) obsahuje: 67 mg Fipronilumu, Fypryst 134 mg pro psy: 1 pipeta (1,34 ml) obsahuje: 134 mg Fipronilumu, Fypryst 268 mg pro psy 1 pipeta (2,68 ml) obsahuje: 268 mg Fipronilumu, Fypryst 402 mg pro psy: 1 pipeta (4,02 ml) obsahuje: 402 mg Fipronilumu. **Indikace:** Fypryst pro kočky: Léčba a prevence napadení blechami (*Ctenocephalides felis*) a klíšatými (*Rhipicephalus* spp., *Dermatocentor* spp., *Ixodes* spp.) u koček. Léčba a kontrola alergie na bleší kousnutí (FAD) u koček. Prevence a léčba napadení všenkami (*Felicola subrostratus*) u koček. Fypryst pro psy: Léčba a prevence napadení blechami (*Ctenocephalides* spp.) a klíšatými (*Rhipicephalus* spp., *Dermatocentor* spp., *Ixodes* spp.) u psů. Léčba a kontrola alergie na bleší kousnutí (FAD) u psů. Prevence a léčba napadení všenkami (*Trichodectes canis*) u psů. **Dávkování:** Minimální léčebný interval je 4 týdny. Přípravek je účinný proti napadení blechami po dobu 2 měsíců a proti klíšatům po dobu až 4 týdnů, v závislosti na síle zamoření prostředí. Blechy jsou usmrceny během 24 hodin po napadení. **Kontraindikace:** Vzhledem k absenci dostupných údajů přípravek nepoužívejte u štěňat a koťat mladších 8 týdnů a/nebo vážících méně než 2 kg (psi) nebo méně než 1 kg (kočky). Přípravek nepoužívejte u nemocných zvířat (systémové onemocnění, horečka) nebo zvířat v rekonvalescenci. Nepoužívejte u králíků z důvodu nebezpečí nežádoucích reakcí či dokonce úhynu. **Zvláštní upozornění:** Vyhnete se kontaktu přípravku s očima zvířete. Před podáním přípravku odstraňte klíšty přítomné na zvířeti. Přípravek aplikujte na místo, ze kterého si jej zvíře nemůže slíznout, a po aplikaci zabraňte vzájemnému olizování zvířat. Během dvou dnů po aplikaci přípravku by se mělo vyhnout koupání/ponoření do vody a koupání častěji než 1x týdně. Tento přípravek může způsobit podráždění sliznice a očí. Proto se vyhněte kontaktu tohoto přípravku s ústy a očima. **Interakce:** Nejsou známy. **Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky:** Přípravek může být aplikován chovným a březím fenám a kočkám a fenám a kočkám v laktaci. **Nežádoucí účinky:** Pokud dojde k oliznutí, může se objevit krátkodobá hypersalivace způsobená hlavně charakterem nosiče. Mezi velmi vzácnými nežádoucími účinky byly po použití zaznamenány přechodné kožní reakce v místě aplikace (vyblednutí kůže, lokální vypadávání srsti, svědění, zarudnutí kůže) a celková svědění nebo vypadávání srsti. **Doba použitelnosti:** 3 roky. **Uchovávání:** Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. **Balení:** Krabička obsahuje 1 pipetu. Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu. Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

**FYPRYST combo** 50 mg/60 mg pro kočky a fretky, jedna pipeta 0,5 ml obsahuje: Fipronilumu 50 mg (S)-Methoprenumu 60 mg. FYPRYST combo 67 mg/60,3 mg pro malé psy: jedna pipeta 0,67 ml obsahuje: Fipronilumu 67 mg, (S)-Methoprenumu 60,3 mg. FYPRYST combo 134 mg/120,6 mg pro střední psy: jedna pipeta 1,34 ml obsahuje: Fipronilumu 134 mg, (S)-Methoprenumu 120,6 mg. FYPRYST combo 268 mg/241,2 mg pro velké psy: jedna pipeta 2,68 ml obsahuje: Fipronilumu 268 mg, (S)-Methoprenumu 241,2 mg. FYPRYST combo 402 mg/361,8 mg pro velmi velké psy: jedna pipeta 4,02 ml obsahuje: Fipronilumu 402 mg, (S)-Methoprenumu 361,8 mg. **Indikace:** U koček a fretek: Léčba napadení blechami (*Ctenocephalides* spp.). Insekticidní účinek proti novému napadení dospělými blechami trvá po dobu 4 týdnů. Prevence množení blech potlačení vývoje vajíček (ovicidní účinek), larev a jejich vývojových stádií (larvicidní účinek) vyvinutých z vajíček nakladených dospělými blechami po dobu šest týdnů po aplikaci. Léčba napadení klíšatými (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*). Přípravek má trvalý akaricidní účinek po dobu až 2 týdnů proti klíšatům u koček a po dobu 4 týdnů u fretek. Pouze u koček: léčba napadení všenkami (*Felicola subrostratus*). Přípravek je možné použít jako součást léčebné strategie při zvládání alergické dermatitidy po bleším kousnutí (FAD), pokud již byla dříve diagnostikována veterinárním lékařem. U psů: K léčbě psů, dávkování je definováno podle skupin živé hmotnosti. K použití proti napadení blechami, a to pouze blechami nebo blechami spolu s klíšatými a/nebo všenkami. Léčba napadení blechami (*Ctenocephalides* spp.). Insekticidní účinek proti novému napadení dospělými blechami trvá po dobu 8 týdnů. Prevence množení blech potlačení vývoje vajíček (ovicidní účinek), larev a jejich vývojových stádií (larvicidní účinek) vyvinutých z vajíček nakladených dospělými blechami po dobu 8 týdnů po aplikaci. Léčba napadení klíšatými (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Dermacentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*). Přípravek má trvalý akaricidní účinek po dobu až 4 týdnů proti klíšatům. Léčba napadení všenkami (*Trichodectes canis*). Přípravek je možné použít jako součást léčebné strategie při zvládání alergické dermatitidy po bleším kousnutí (FAD), pokud již byla dříve diagnostikována veterinárním lékařem. **Dávkování:** Pouze k vnějšímu použití, podání nakapáním na kůži – spot-on. Minimální interval mezi aplikacemi 4 týdny. **Kontraindikace:** Kočky a fretky: Vzhledem k absenci odpovídajících údajů nesmí být přípravek používán u koťat mladších 8 týdnů a/nebo o hmotnosti nižší než 1 kg. Přípravek nepoužívat u fretek mladších 6 měsíců. Psi: Vzhledem k absenci odpovídajících údajů nesmí být přípravek používán u štěňat mladších 8 týdnů a/nebo o hmotnosti nižší než 2 kg. Nepoužívat u králíků z důvodu nebezpečí nežádoucích účinků nebo až úhynu. Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivé látky nebo na některou z pomocných látek. **Zvláštní upozornění:** Blechy z domácích zvířat často napadají zvířecí přípravky, místa, kde zvíře spí a obvykle odpočívá, jako jsou koberec a domácí vybavení, které je třeba v případě masivního napadení a na začátku ochranných opatření pravidelně ošetřovat vhodnými insekticidy a čistit pomocí vysavače. Zabraňte kontaktu přípravku s očima zvířete. Zabraňte kontaktu přípravku s očima zvířete. Je důležité zajistit aplikaci přípravku na takové místo, ze kterého si jej zvíře nemůže slíznout a po aplikaci zabránit vzájemnému olizování zvířat. Může dojít k uchycení jednotlivých klíšat. Proto nelze zcela vyloučit přenos infekčních chorob, pokud jsou podmínky významně nepříznivé. Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům: Tento přípravek může způsobit podráždění sliznice, kůže a očí. Proto zabraňte kontaktu přípravku s ústy, kůží a očima. Po použití si umyjte ruce. V případě náhodného požití vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud místo aplikace nezaschne. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale v podvečer, a nedovolit čerstvě ošetřeným zvířatům spát s jejich majiteli, zejména s dětmi. **Interakce:** Nejsou známy. **Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky:** U koček: přípravek lze použít během březosti. U fretek: bezpečnost veterinárního léčivého přípravku nebyla stanovena u fretek během březosti a laktace. Psi: Přípravek lze použít během březosti a laktace. **Nežádoucí účinky:** Vyvarujte se předávkování. Mezi velmi vzácné se vyskytujícími možnými nežádoucími účinky byly po použití hlášené kožní reakce v místě aplikace (odlupování kůže, lokální ztráta srsti, svědivost, zarudnutí) a celková svědivost nebo ztráta srsti. Nadměrné slinění, reverzibilní nervové příznaky (zvýšená citlivost ke stimulačním podnětům, deprese, jiné nervové příznaky) nebo zvracení byly rovněž po použití pozorovány. Pokud došlo k olizání místa podání, může se objevit krátká perioda nadměrného slinění jako reakce vyvolaná převážně vlastnostmi nosiče. **Doba použitelnosti:** 2 roky. **Uchovávání:** Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Platí pouze pro balení 1 pipeta: veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu. Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

**Před použitím všech přípravků si pečlivě přečtete příbalový leták. Pouze pro zvířata.**